

- Auris Nasus Larynx 2007; 34: 207-211.
19. Welz S, Schmid A, Hehr T, et al.: Treatment-outcome for synchronous head-and-neck and oesophageal squamous cell carcinoma. Radiother Oncol 2005; 77: 267-270.
20. Wind P, Rouillet MH, Quinaux D, Laccoureye O, Brasnu D, and Cugnenc PH: Long-term results after esophagectomy for squamous cell carcinoma of the esophagus associated with head and neck cancer. Am J Surg 1999; 178: 251-255.

同時或異時發生之口咽、咽喉或下咽癌及食道癌之治療結果

許哲瑜¹ 成佳憲^{1,2,3} 郭頌鑫¹ 陳育瑄¹ 蔡巧琳¹ 藍耿學¹ 陳婉瑜¹ 王駿瑋¹

台大醫院 放射腫瘤科¹

台灣大學醫學院 癌症研究中心² 臨床醫學研究所³

目的：呈現頭頸部上皮癌（口咽、咽喉及下咽癌）伴隨同時或異時發生食道癌的病人，近十年來之治療經驗。

材料及方法：本研究含 1998 至 2008 年，罹患同時或異時發生的口咽癌、咽喉或下咽癌及食道癌的病人。同時發生的定義為兩種腫瘤發生的時間在六個月內，異時發生的定義是兩種癌症發生的時間間隔大於六個月。在食道腫瘤的治療，有 11 位病人最終有接受手術切除，其餘 22 位病人則只接受放（化）療。在頭頸癌治療方面，有 15 個人接受手術切除，其餘 18 人只有接受放化療。

結果：共 33 位病人收錄進本研究，其中 10 人罹患同時發生的癌症，其餘 23 人有異時發生的癌症。在本研究存活病人追蹤時間的中位數是 41.3 個月。所有病人存活時間及無疾病存活時間的中位數分別是 13.6 及 9.3 個月。在單變數分析中，對於存活時間與無疾病存活時間的良好預後因子為早期的食道癌。食道腫瘤的手術切除在預後方面有較佳的趨勢。

結論：同時或異時發生的口咽癌、咽喉或下咽癌及食道癌常伴隨著不好的治療結果。發現時為早期之食道腫瘤能伴隨著較佳的預後。能以手術治療食道腫瘤的病人，在無疾病存活時間也有較佳的結果。

[放射治療與腫瘤學 2012; 19(2): 119-129]

關鍵詞：下咽、口咽、咽喉、食道