

眼眶惡性纖維組織細胞瘤——病例報告

劉慶鴻^{1,2} 洪純玲²

惡性纖維組織細胞瘤是在 1960 年代被提出,用來描述一群軟組織瘤。它是成人的軟組織瘤中最常見的一種。佔了所有軟組織瘤中 10.5%。大約所有惡性腫瘤的 0.1%。在過去,惡性纖維組織細胞瘤是用來形容那些難以分類的腫瘤的大集合。在 1988 年,惡性纖維組織細胞瘤被分類成 5 型,其中以貯藏形成型最常

見。大部份的惡性纖維組織細胞瘤發生在肢體,在頭頸部的區域是十分少見的。我們在此提出一病例報告。61 歲男性、右眼眼球癆,並於右眼眼眶內有一惡性纖維組織細胞瘤。腫瘤起源為周圍軟組織,病理切片顯示為惡性纖維組織細胞瘤中的貯藏形成型。

智慧藏

投稿日期：93 年 2 月 10 日。修改日期：93 年 3 月 19 日。通過日期：93 年 5 月 7 日。

1 高雄縣立岡山醫院 眼科 2 台南市立醫院 眼科

聯絡人及抽印本索取：劉慶鴻 701 台南市崇德路 670 號 台南市立醫院 眼科