

類固醇治療急性視網膜壞死誘發 另一眼中心性漿液性脈絡膜視網膜症 ——病例報告

林泰祺¹ 李安斐^{1,2} 劉郁琦¹ 李淑美^{1,2}

目的：報告一因使用類固醇治療急性視網膜壞死，而誘發另一眼中心性漿液性脈絡膜視網膜症的病例。

方法：病例報告。

結果：一位 38 歲男性主訴左眼視力模糊及看到飛蚊達兩個星期之久而前來眼科門診求診。當時左眼的最佳矯正視力為 6/20，裂隙燈下可見前葡萄膜炎及角膜內皮羊脂狀沉積。眼底檢查發現玻璃體炎、周邊的視網膜有白化壞死合併血管阻塞。給予全身性抗病毒藥物 Acyclovir 及大量的類固醇治療後，壞死的視

網膜區域大為減少且眼睛的發炎獲得改善。最佳矯正視力也回復到 6/5。然而，在治療的過程中另一眼出現中心性漿液性脈絡膜視網膜症，於是又進一步安排右眼的雷射光凝固治療。

結論：使用全身性類固醇治療急性視網膜壞死的過程中，可能會誘發另一眼中心性漿液性脈絡膜視網膜症。因此在治療時我們需要密切追蹤另一眼，除了可能繼發的另一眼急性視網膜壞死外，也必須注意其他可能的視網膜病變，譬如：中心性漿液性脈絡膜視網膜症。

智慧藏

投稿日期：98 年 12 月 22 日。修改日期：99 年 2 月 1 日。通過日期：99 年 8 月 11 日。

¹台北榮民總醫院 眼科部 ²國立陽明大學

聯絡人及抽印本索取：李淑美 112 台北市北投區石牌路二段 201 號 台北榮民總醫院 眼科部