

- Current progress of immunostains in Mohs micrographic surgery: a review. *Dermatol Surg* 2008; 34(12): 1621-1636.
13. Zampogna JC, Flowers FP, Roth WI, Hassenein AM: Treatment of primary limited cutaneous extramammary Paget's disease with topical imiquimod monotherapy: two case reports. *J Am Acad Dermatol* 2002; 47(4 Suppl):S229-235.

會陰部乳房外柏哲德氏病的放射治療：病例報告

張國楨¹ 張慶雄¹ 曾暉華² 胡渝昌¹ 陳建勳¹ 梁頌文¹

高雄榮民總醫院 放射腫瘤科¹ 病理部²

乳房外柏哲德氏病 (Extramammary Paget's Disease) (EMPD) 是一罕見的疾病，好發年紀在 50 至 80 歲，好發部位在汗腺較發達的地方如肛門周圍、陰囊、會陰與外陰部。臨床症狀很像乳頭的柏哲德氏病，主要的症狀為搔癢，情況與一般細菌感染相似，很容易被誤診，一開始呈現界限明顯、單一脫屑性表層的紅疹，常被當成慢性濕疹治療，延誤治療的時機，增加癌症細胞轉移的機會，同時會合併有其他鄰近器官的癌症。

治療傳統以外科手術切除，一般來說，預後良好但復發率高。如位在解剖位置複雜的地方如會陰、肛門周圍等處，為要達根除目的，甚至要需要切除肛門，對病人心理與生活上造成很大的影響保守性治療有局部化療、局部免疫調節藥物或放射治療，但都因病例不多，無法有確切的定論。藉由此文報告一位以放射線治療乳房外柏哲德氏病的病例，並回顧有關乳房外柏哲德氏病以放射線治療的文獻，提供大家對此一疾病除手術外另一效果不錯的選擇。

[放射治療與腫瘤學 2010; 17(4): 317-322]

關鍵詞：乳房外柏哲德氏病、會陰部、放射線治療