

子宮頸癌輔助性放射線治療的預後因子 -- 回溯性研究

陳柏均 劉文山 陳建勳 張慶雄 唐佩玲 梁頌文 胡渝昌 張國楨

高雄榮民總醫院 放射腫瘤科

目的：此回溯性研究針對接受過輔助性放射線治療的子宮頸癌患者，研究影響整體存活率及無病存活率的預後因子。

材料與方法：本研究從2000至2006年於高雄榮民總醫院收錄149名接受輔助性放射線治療的子宮頸癌患者。利用單變項與多變項，分析各種可能影響存活率之預後因子。

結果：病患之中位數年齡為55歲。子宮頸癌患者依據分期，IB有102位，IIA有33位，IIB-IVA有14位。分期為IB的五年整體存活率及無病存活率分別為75.2%及65.4%。分期為IIA的五年整體存活率及無病存活率分別為69.7%及70.5%。分期為IIB-IVA的五年整體存活率及無病存活率分別為66.7%及50%。多變項分析顯示子宮旁侵犯以及腺癌顯著影響整體存活率。

結論：子宮旁侵犯以及腺癌類型的組織型態為最重要的預後因子。另外，在我們的研究中，輔助性化療並不能提升存活率。

[放射治療與腫瘤學 2013; 20(2): 89-96]

關鍵詞：子宮頸癌、輔助性放射線治療、預後因子

智慧藏