

成人腹腔內及後腹腔淋巴管瘤：六病例報告

謝閔傑 涂啟文 江慶鐘 史兆明

淋巴管瘤是一種好發於兒童，罕見的淋巴系統的先天性異常。約95%的淋巴血管瘤發生於頸部和腋下，而其他部位，包括腹腔的淋巴血管瘤佔的比率少於5%。腹腔內的淋巴血管瘤可能發生於腸繫膜、胃腸道、後腹腔、脾臟、肝臟和胰臟。我們分析六位腹腔內淋巴血管瘤成人病患的臨床表現、影像學特徵及治療成果。

研究方法採回溯性分析，2001年至2006年本院共治療六位腹腔內淋巴血管瘤病患，收集他們的病例紀錄、手術紀錄及病理資料。

六位病患性別分別為三位男性與三位女性。診斷時的平均年齡為38歲（由22歲至57歲）。臨床上

主要的症狀為腹脹（2位）、腰痛（2位）及排便裏急後重（1位）。另一位病患術前並無症狀，在治療十二指腸腫瘤時於手術中意外發現。淋巴血管瘤分別發生於腸繫膜（2位）、後腹腔（2位）、空腸（1位）及脾臟（1位）。六位病患都接受手術將病灶完全切除，在平均追蹤2年（由2個月至4.5年）的期間內，都沒有復發的案例。

成人的腹腔內淋巴血管瘤屬於良性，且生長緩慢。它們在嬰兒時期就已經形成，但病程進展相當緩慢，可於成人時期才出現症狀。在診斷確立之後，應該儘早接受手術將病灶完全切除，因為疾病的預後相當的好。

智慧藏