

## 外傷性頸動脈海綿竇瘻管導致遲延性 中心性視網膜靜脈阻塞——病例報告

陳慶隆<sup>1,4</sup> 蔡元雄<sup>3,4</sup> 吳佩蓁<sup>2,4</sup> 周宗賢<sup>2,4</sup> 賴建雄<sup>2,4</sup>

目的：報告一例未曾接受治療之外傷性頸動脈海綿竇瘻管患者，發生遲延性中心性視網膜靜脈阻塞，在眼底攝影，電腦斷層血管攝影，腦血管攝影，及光學同調電腦斷層上的表現。

方法：病例報告。

結果：一名 56 歲男子於跌落頭部左側外傷發生左眼腫脹及異音，但於數週後痊癒且無明顯眼部不適。於受傷後約 2 個月發生視力逐漸模糊，雙眼複視。4 個月後，因眼球外凸，前來就醫。眼科檢查發現眼球前凸，結膜血管擴大扭曲，左外側轉局限，視

網膜出血，靜脈擴大扭曲，及棉狀滲出物，最佳矯正視力僅 20/70。沒有眼壓增加及視神經傳導異常。經血管攝影發現動脈期上眼靜脈及海綿竇擴大，屬於直接型。建議接受血管內栓塞治療，但患者因須再考慮及健保與經濟上考量而出院。

結論：因外傷性頸動脈海綿竇瘻管所致之非缺血性中心性視網膜靜脈阻塞的似乎擁有較好視力癒後，早期發現及治療可能預防中心性視網膜靜脈阻塞及視力受損。

智慧藏

投稿日期：97 年 4 月 1 日。修改日期：97 年 6 月 9 日。通過日期：97 年 6 月 18 日。

<sup>1</sup>長庚紀念醫院 林口院區 眼科部    長庚紀念醫院 嘉義院區 <sup>2</sup>眼科部 <sup>3</sup>放射診斷科

<sup>4</sup>長庚大學醫學院—桃園

聯絡人及抽印本索取：賴建雄 613 嘉義縣朴子市嘉朴路西段 6 號 嘉義長庚紀念醫院 眼科部