

## 幼年型視網膜分離症——病例報告

周師宇 蔡德中 李鳳利 許紋銘

本文報導兩例罹患幼年型視網膜分離症的男性個案，病例一為一現年十歲男性，主訴自七歲起便有視力較模糊之現象，眼底檢查發現雙眼黃斑部均有如鈍齒輪般之黃斑部病變，同時並伴隨有下側顳部區域之視網膜分離表現。在視網膜分離的空腔上，可發現許多明顯內層裂孔分佈其中。病人最佳矯正視力右眼為零點二、左眼為零點三。在連續三年的追蹤期間，均沒有視網膜剝離或玻璃體出血的現象產生。病例二

則為現年二十一歲男性，首度發現視力模糊時為九歲，可見雙眼黃斑部有典型之車輪輻射狀黃斑部變化，同時可見雙眼顳側上下邊緣有視網膜分離現象。以眼底視網膜斷層掃描(OCT)檢查，可見黃斑部下有明顯水泡狀變化，此病人雙眼最佳矯正視力迄今均維持零點二。雖然這兩位病人均無明顯可追溯之家族病史，但仍需提醒其性聯隱性遺傳的可能性，並持續追蹤。

智慧藏

投稿日期：92年5月3日。修改日期：92年6月24日。通過日期：92年11月20日。

台北榮民總醫院 眼科部 國立陽明大學醫學院

聯絡人及抽印本索取：李鳳利 112 台北市石牌路二段 201 號 台北榮民總醫院 眼科部