

## 台灣產當藥屬植物之訂正

王震哲<sup>(1,2)</sup>、呂長澤<sup>(1)</sup>

(收稿日期: 1998年10月20日; 接受日期: 1998年11月16日)

## 摘 要

依據臺灣植物誌 (Liu & Kuo, 1978) 的記載, 台灣產當藥屬植物共有五個分類群, 然近年來陸續有台灣及大陸之學者重新對本屬植物予以分類處理, 各方之分類研究結果頗不一致, 顯示仍有深入研究之必要。本文針對台灣產之當藥屬植物進行詳盡的分類研究, 研究結果將臺灣產的本屬植物處理為四個分類群。其中將細葉當藥 (*S. matsudae* Satake) 併入高山當藥 (*S. tozanensis* Hayata) 處理為同種, 依循 Ho et al. (1988) 之意見將巒大當藥 (*S. randaiensis* Hayata) 併入大籽當藥 (*S. macrosperma* (C. B. Clarke) C. B. Clarke), 並將新店當藥 (*S. shintenensis* Hayata) 處理為種的階級。

研究結果顯示花冠裂片上的腺體形態及位置為區分台灣產當藥屬植物最主要的特徵, 另外, 植物的習性、萼片形態以及種子的數目及形態, 亦可作為有效的分類特徵。本文並提供種之檢索表, 各種之描述、繪圖及分類註釋。

關鍵詞: 龍膽科、訂正、當藥屬、臺灣、分類。

智慧藏

---

1. 國立台灣師範大學生物系, 台北市文山區117, 台灣, 中華民國。  
2. 通信聯絡員。