

## 原發性攝護腺鱗狀上皮癌：病例報告

蔡秉儒<sup>1</sup> 余家政<sup>2</sup> 王志生<sup>3</sup> 吳東霖<sup>2</sup> 黃榮慶<sup>2</sup>

原發性攝護腺鱗狀上皮癌是一種少見的惡性腫瘤，約佔全部攝護腺癌0.2~0.6%。其發生的原因並非十分清楚。我們發表此疾病的臨床、生化特徵及治療方法。我們以回溯法去尋找本院從1990年11月到2007年6月患有攝護腺癌症的病患。其中，在1389位的攝護腺癌症病患中，只發現1個為原發性攝護腺鱗狀上皮癌。這位病患年紀為71歲，其臨床症狀包括膀胱出口阻塞、血尿及解尿疼痛。經直腸超音波檢查並未顯示有低回音病兆處。攝護腺特異特原也在正常範圍

內。肛門指診顯示堅實的堅硬度，雙側對稱性增大，並無明顯堅硬的腫塊。診斷經由病理切片檢驗確定。攝護腺鱗狀上皮臨床上的表現十分惡性，從確定診斷後平均存活時間約14個月。參考的文章提及根除性手術、放射治療及用mitroxantrone及cisplatin為化學劑的化學治療，但此疾病對各種治療的反應仍不十分良好。原發性攝護腺鱗狀上皮癌相當稀少，臨床上表現十分惡性，預後亦不好，故作此報告。

智慧藏

龍泉榮民醫院 外科部<sup>1</sup> 高雄榮民總醫院 外科部 泌尿外科<sup>2</sup> 病理部<sup>3</sup>

受理日期：民國96年8月17日 接受日期：民國96年12月27日