

## 上頷竇扁平細胞癌之放射治療結果

許智捷<sup>1</sup> 雷 德<sup>1</sup> 鍾娜娜<sup>1</sup> 丁禮莉<sup>1</sup> 邵文逸<sup>2</sup>

<sup>1</sup>台大醫院 放射治療科

<sup>2</sup>台灣大學公衛學院 預防醫學研究所

**目的：**評估上頷竇癌用不同治療方式後的結果。

**材料與方法：**從 1977 至 1991 年 61 個上頷竇扁平細胞癌中，有 11 個病人（18%）是 T3, 50 個病人（82%）是 T4。其中 18 個病人只作放射治療，32 個病人術後追加放射治療，11 個病人合併放射治療，竇造口術及動脈內注射化學治療。

**結果：**以上三組病人五年存活率分別為 5.6%，34.4% 及 54.5%，具有明顯統計差別。在診斷時有淋巴轉移的病人，其五年存活率較無淋巴轉移病人明顯偏低（7.1% 比 36.2%）。多變數分析得出性別，治療方式，淋巴分期為顯著的預後因子。

**結論：**合併治療比只作放射治療有較好的五年存活率。

[放射治療與腫瘤學 1998; 5: 163-170]

關鍵詞：放射治療、合併治療、上頷竇、扁平細胞癌



智慧藏