

槲櫟(殼斗科)在臺灣的再發現

蘇夢淮⁽¹⁾、吳聖傑⁽¹⁾、謝長富⁽¹⁾、陳欣一⁽²⁾、楊國禎^(2,3)

(收稿日期：2003 年 4 月 9 日；接受日期：2003 年 5 月 9 日)

摘 要

臺灣植物誌中所記載的孛孛櫟 (*Quercus aliena* Blume var. *acutiserrata* Maxim. ex Wenz.) 是 1924 年由島田彌市首次於新竹縣紅毛所採集的標本，此後一直未曾有過野外的採集紀錄。2002 年我們於紅毛南方 3 公里靠近牛牯嶺的鳳山地區再度找到該種殼斗科植物。然而，在觀察比較島田彌市及本次採集標本的形態特徵之後，我們認為這種植物應該是槲櫟 (*Q. aliena* Blume) 而非孛孛櫟。本文詳細描述該種植物，指明槲櫟及孛孛櫟之差異點，並提供台灣相關種類之檢索表。槲櫟目前已知的族群量很小，且生育地曾遭受人為的嚴重干擾。由於干擾的壓力目前仍然存在，所以我們建議有關單位應該儘速採取棲地保護的措施。

關鍵詞：槲櫟、特徵描述、分佈、臺灣植物誌、稀有種、分類。

智慧藏

-
1. 國立臺灣大學植物學系，臺北市 106 羅斯福路 4 段 1 號，臺灣。
 2. 靜宜大學生態學研究所，臺中縣 433 沙鹿鎮中棲路 200 號，臺灣。
 3. 通信作者。E-mail: kcyang@pu.edu.tw